

Ähnliche Arten

In Luxemburg können nur der Biber und die Nutria mit der Bisamratte verwechselt werden. Der Biber ist eine einheimische Art, während die Nutria wie die Bisamratte eine invasive Art ist.

Esinheimische Art Europäischer Biber

Castor fiber

Sehr flacher Schwanz

Keine auffallenden Tasthaare

Körpergröße: zwischen 70-100 cm

Schwanzlänge: 25-37 cm



© Jiri Bohdal

Allochthone Art Nutria

Myocastor coypus

Zylinderförmiger Schwanz

Weißer Tasthaare

Orangefarbene Schneidezähne

Körpergröße: ungefähr 50 cm

Schwanzlänge: 25-45 cm



© Guillaume Koch

Referenzen und Zusatzinformationen

<https://neobiota.lu/ondatra-zibethicus/>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rat_musqu%C3%A9

http://www.fdgdon53.fr/rat_musque_ondrata_zybethicus.html

http://materiel-pedagogique.com/Biologie/12037-Biologie_rat_musqu__district_Zeya_de_la_r_gion_de_l_Amour.html



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures

Administration de la nature et des forêts