Saisies-Masken fir eng Lëscht vu taxon-spezifeschen Beobachtungen anzeginn (Vullen, Päiperleken, Fliedermais, Amphibien, ….). Benotzt d'Saisies-Masken virun allem wann et keng Feldbeobachtung ass mee eng aaner Beobachtungsmethod ewéi: Falen opstellen, mam Netz fänken, Detektoren benotzen, e.t.c.





Saisies-Masken fir eng Lëscht vu taxon-spezifeschen Beobachtungen anzeginn

1. Ënner **Är Beobachtungen**, klickt op **Saisies-Masken**.
2. Klickt op All Saisies-Masken.
3. Op den Stär klicken fir eng bestëmmte Saisies-Mask (zB: Lepidoptera) bei Meng Saisies-Masken derbäizesetzen.

Verschidde Saisies-Masken, zB: Lepidoptera



Fir eng Päiperleksbeobachtung anzeginn, op **Lepidoptera Beobachtungen aginn** klicken.



Lepidoptera Beobachtungen aginn

Dir musst en **Datum** uginn an en **Numm vum Beobachter** (dir selwer oder eng aaner Persoun). Dir kënnt méi Aarten (nëmmen Lepidoptera) aginn an wien se identifizéiert huet. Zousätzlech kann bei den Saisies-Masken d’Beobachtungsmethod an weider Detailer agedroe gin.



Aart derbäisetzen – Numm antippen

Klickt dann op **Wou war et**?



Gitt den Numm vun der Plaz an, wielt dann de Lieu–dit aus. Dann klickt op d’Kaart fir déi genau Lokalitéit unzeginn. Oder navigéiert op der Kaart, sicht d‘Plaz a klickt drop.

No enger Plaz sichen: Gitt e Numm an. Klickt op sichen.

Dann e Lieu-dit auswielen



Fir är Saisie ofzeschléissen, klickt op **Fortschécken**.